



AV... min tand!

Tandskader på
mælketænder og
blivende tænder

Mælketænder

Tanden har fået et slag; der er ikke umiddelbart noget at se.

Kontakt tandlægen da det kan medføre:

1. Tandpine
2. At tanden bliver mørk.
3. At der kan være sket skade på de blivende tænder.

Et hjørne af tanden er slået af / tanden er evt. løs.

Kontakt tandlægen da det kan medføre:

1. Tandpine
2. At der kan være sket skade på de blivende tænder.

Tanden er slået helt ud.

Kontakt tandlægen:

1. Mælketænder skal **ikke** sættes på plads igen, da det kan skade de blivende tænder.

Blivende tænder

Tanden har fået et slag; der er ikke umiddelbart noget at se.

Kontakt tandlægen da det kan medføre:

1. Tandpine.
2. At tanden bliver mørk.

Et hjørne af tanden er slået af / tanden er evt. løs.

Kontakt tandlægen da den kan medføre:

1. Tandpine.
2. Problemer med tanden senere, hvis den ikke bliver ordnet hurtigt.

Tanden er slået helt ud.

1. Find tanden straks, prøv selv at sætte tanden på plads, da det er vigtigt for tandens overlevelseschance, at det sker inden for en halv time efter uheldet. Kontakt derefter tandlægen.
2. Kan tanden ikke sættes på plads, så placér den i munden(helst bag underlæben), i et glas saltvand eller mælk. Kontakt tandlægen straks.

3. **Vigtigt:** Opbevar tanden fugtigt.

Gode råd ved tandskade

1. Skyl/rens de slåede tænder med Klorhexidin 0,1% morgen og aften, børst med Zendium
2. Skån de skadede tænder med blød kost i ca. 8 dage.

NB!

Inden skaden sker, check at du/I har en tandskadeforsikring. Hvis tandskaden skulle ske, vil tandlægen være behjælpelig med udfyldelse af evt. forsikringspapirer.

Venlig hilsen
Aabenraa Kommunale Tandpleje

